



Anwendungsdatenblatt: Kartoffeln

Allgemeine Informationen herbagreen® Z20	herbagreen® Z20 ist eine eingetragene Marke der SanoVita GmbH und ist ein Naturprodukt, welches sich aus Calcit und Zeolith zusammensetzt. herbagreen® Z20 fördert ein schnelleres und gesünderes Pflanzenwachstum. herbagreen® Z20 ist ein mikronisiertes Pulver und wird als wässrige Suspension, in Form eines feinen Nebels, zur Blattapplikation angewendet.
Allgemeine Informationen herbagreen® fluisan	herbagreen® fluisan ist eine eingetragene Marke der SanoVita GmbH und ist ein Naturprodukt, welches sich aus Hopfen- und Pflanzenextrakt zusammensetzt. herbagreen® fluisan fördert ein pflanzenstärkendes und gesünderes Pflanzenwachstum. herbagreen® fluisan ist ein flüssiges Produkt und wird als wässrige Suspension, in Form eines feinen Nebels, zur Blattapplikation angewendet.
Listungen / Zulassungen	Gelistet in der FiBL-Betriebsmittelliste für ökologische Produktion in Deutschland und EU, entspricht VO (EU) 2018/848 und 2021/1165.
Hinweise zum Zeitpunkt und zur Dosierung	Anwendungen 4 X gemäß BBCH Skala (Entwicklungsstadien der Pflanzen) Erste Anwendung: 2.5 kg/ha herbagreen® Z20 + 100 ml herbagreen fluisan BBCH Phase 23-25 - Hauptspross entfaltet, Entwicklung der Seitensprossen. Verwendung von 300-500 l Wasser Zweite Anwendung 2.5 kg/ha herbagreen® Z20 BBCH Phase 38-40: 80% der Pflanzen in der Reihe berühren sich, Beginn Bestandsschluss und Knollenentwicklung Verwendung von 300-500 l Wasser Dritte Anwendung: 2.5 kg/ha herbagreen® Z20 BBCH Phase 52-54: Vor der Blüte, Blütenanlage / Blütenblätter sichtbar Verwendung von 500-750 l Wasser Vierte Anwendung: 2.5 kg/ha herbagreen® Z20 BBCH Phase 67-69 Ende der Blüte Verwendung von 500-750 l Wasser
Hinweise zur Anwendung	Füllen Sie für jede Anwendung 10 Liter Wasser in einen Eimer. Fügen Sie für die erste Anwendung zuerst herbagreen® fluisan und danach herbagreen® Z20 in den Eimer, bitte sehr gut umrühren. Fügen Sie für die weiteren Anwendungen herbagreen® Z20 in den Eimer, bitte sehr gut umrühren. Gießen Sie die entsprechende Menge Wasser in das Spritzgerät und füllen sie die vorbereitete herbagreen® Suspension hinzu. Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe, oder das Rührwerk für eine perfekte Durchmischung der herbagreen® Suspension mit dem Wasser im Spritztank gewährleistet. Das Besprühen der Pflanzen sollte in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag durchgeführt werden.



Anwendungsdatenblatt: Kartoffeln

	Verbrauch ca. 300 - 750 Liter / Wasser für 1 ha landwirtschaftlicher Fläche. Suspension / Wasser-Gemisch in einem feinen Nebel applizieren, auf beiden Seiten der Blätter. Idealer Druck von 4-6 bar und alle Düsen (Keramikinlet) sollte einen Durchmesser von 150 bis 300 Mikrometer haben. Spritzgeräte sollten sofort nach Gebrauch sorgfältig gereinigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der pH-Wert der Sprühlösung bei pH 6-7 liegt.
Auswirkung von herbagreen®	• Erhöhung der Erntemenge • Verbesserte Pflanzenvitalität • Verbesserte Sortierung • Verbesserte Lagerung - Haltbarkeit • Das Immunsystem der Pflanzen wird gestärkt • Erhöhte Toleranz gegenüber abiotischen und biotischen Pflanzenstress
Hinweise	• herbagreen® Z20 und herbagreen® fluisan sollten nicht häufiger als beschrieben angewendet werden • Nicht einatmen • Nicht essen und trinken • Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren • Die Produkte kühl und trocken lagern
Haftungsausschluss	Bei nicht sachgemäßer Anwendung des Produktes, gemäß den Anweisungen, lehnt SanoVita GmbH jegliche Haftung ab.




Anwendungsdatenblatt: Kartoffeln

Potato

The 2-digit decimal code

0 Sprouting	1 Leaf development	5 Inflorescence emergence	6 Flowering	7 Development of fruit	8 Ripening of fruit and seed	9 Senescence
01 05 09	11 15 19	51 55 59	61 65 69	71 75 79	81 85 89	91 93 95 97
		Tuber formation 40	43	45	47	48 49



0 Sprouting	1 Leaf development main stem												2nd order			3rd order			4th order		
001 005 009	101 105 109	111 115 119	121 125 129	131 135 139	141 145 149																
						5 Inflorescence emergence main stem			2nd order			3rd order			4th order						
						501 505 509	521 525 529	531 535 539	541 545 549												
						6 Flowering main stem			2nd order			3rd order									
						601 605 609	621 625 629	631 635 639													
						7 Development of fruit main stem			2nd order												
						701 705 709	721 725 729														
						8 Ripening of fruit and seed main stem			9 Senescence												
						801 805 809	901 903 905 907														
						4 Tuber formation															
						400	403	405	407				408 409								

© 1993 IVA